

Informasjon til prøvetaker

Farmakogenetiske analyser:

Ett EDTA- eller Citrat-rør. Røret vendes forsiktig 6 ganger. Påfør pasientens fulle navn og personnummer på prøverøret. Ved vanskelig prøvetaking er 0,5 mL tilstrekkelig.

Legemiddelanalyse:

Prøven tas på rør uten tilsetning. Det er tilstrekkelig med 0,5-1 mL serum for flere analyser. Tapp 2-3 ganger så mye blod som ønsket mengde serum. Prøven må koagulere i minimum 30 minutter, og sentrifugeres og avpipetteres innen 2 timer. Prøvetakingstidspunkt og tidspunkt for siste dose må fylles ut på skjema. Påfør pasientens fulle navn og personnummer på prøverørene.

Blodprøve til de fleste serumanalysene bør tas legemiddelfastende, dvs. 12-24 timer etter siste doseinntak.

Unntak:

Legemiddel:	Preparatnavn:	Anbefalt tidsintervall mellom siste doseinntak og prøvetaking:
Amfetamin	Attentin/Elvanse m.fl.	4-8 timer
Atomoksetin	Strattera	4-8 timer
Fentanyl	Durogesic (depotplaster)	Før neste depotplaster
Kodein	Paralgin/Pinex forte	4-6 timer
Kvetiapin	Seroquel (tabletter)	12 timer ± 1 time
	Seroquel (depottabletter)	18-24 timer
Levetiracetam	Keppra	12 timer ± 1 time
Litium	Lithionit	12 timer ± 30min
Oksykodon	OxyNorm (kapsler)	4-6 timer
	OxyContin (depottabletter)	12 timer
Ritalinsyre	Ritalin/Equasym/Concerta	4-8 timer

Ved depotmedikasjon bør prøven tas 0-2 dager før neste depotinjeksjon.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Senter for psykofarmakologi
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23, Vinderen
0319 Oslo
Tlf. 22 02 99 40

Informasjon om analysene

Ved avkryssing for flere legemidler/paneler og/eller CYP-enzymene som genererer samme farmakogenetiske analyse, kjøres analysen kun én gang.

Ytterligere informasjon om farmakogenetiske analyser, legemiddelanalyser, akkrediteringsomfang, måleusikkerhet, referanseområder, forsendelse, oppbevaring og etterrekvirering finnes på www.psykofarmakologi.no. For analyse av CYP1A2, vennligst ta kontakt med oss.

Svar/tolkning av analysene

Farmakogenetiske analyser:

Påviste genvarianter tolkes i forhold til kliniske opplysninger og oppgitte legemidler/avkryssede legemidler. Farmakogenetisk analyse er bare nødvendig å utføre én gang. Ved behov for rådgivning, ta kontakt med Senter for psykofarmakologi, tlf: 22 02 98 99 (lege/farmasøyt).

Legemiddelanalyser:

Analysesvar tolkes i forhold til dose og referanseområde, samt kliniske opplysninger gitt på rekvisisjonen. Det forutsettes at prøven er tatt ved standardbetingelser (se «Informasjon til prøvetaker»).

Informasjon til pasienten

Innsendt blodprøve kan i noen tilfeller bli brukt til forskningsformål. Reservasjon mot dette kan gjøres via Folkehelseinstituttets nettside:

<https://www.fhi.no/div/personvern/om-personvern/biologisk-forskningsreservasjon/>

Blodprøvetaking

Rekvisisjonen medbringes ved prøvetaking ved Senter for psykofarmakologi.

Åpent: kl. 08.00 – 14.00 (ingen timebestilling)

Besøksadresse:

Senter for psykofarmakologi
Psykisk Helsevern Vinderen
Forskningsveien 7, inngang D1
0319 Oslo